

Grado en Ingeniería Química – Matemáticas I – 1ºB

Práctica 3 – MatLab – Sucesiones y Series

0.- Preliminares

a) Crear una carpeta en **c :** \ , por ejemplo **practica3** en la que guardar todo el trabajo.

b) Recordar decirle a MatLab que ponga esa carpeta como Carpeta de Trabajo:

```
>> cd c:\practica3
```

Recordar guardar el trabajo realizado durante la sesión mediante:

```
>> diary 'p3.txt'
```

y no olvidar **al final** hacer:

```
>> diary off
```

Además, hay que guardar aparte las gráficas (formato BMP) y los M-ficheros que se creen.

1.- Sucesiones

Vamos a representar los primeros 20 términos de la sucesión $a_n = \frac{n+1}{n}$

a) Creamos el vector **a**, que tiene en la posición **n** al elemento **a_n**. Se muestran 20 elementos.

```
>> clear all
>> for n=1:20
    a(n)= (n+1)/n; % *****
end
```

b) Hacemos la gráfica con:

```
>> plot(a, '*') % con puntos de coordenadas (i,a(i))
    donde i es la posición del elemento correspondiente del vector a
```

c) Hago una línea horizontal:

```
>> clear n, syms n
>> L=limit((n+1)/n,n,inf) % *****
>> ezplot(L,[0,20]) % marcando el límite
```

d) Pulsa el botón  **Show Plot Tools and Dock Figure**. Pincha en el eje Y y haz que comience en el cero

Ejercicio 1: Calcula el límite y representa los 50 primeros términos de estas sucesiones:

a) $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ b) $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$ c) $a_n = \frac{2^n - 1}{2^{n+1}}$ d) $a_n = \frac{(-2)^{n-1}}{(-2)^{n+1}}$ e) $a_n = \cos \frac{n \cdot \pi}{2}$

f) $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k}$ g) $a_n = \frac{1}{\sqrt{n+1}} + \frac{1}{\sqrt{n+2}} + \frac{1}{\sqrt{n+3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n+n}}$

Cálculo del ej. 1f

```
clear all
for n=1:50
    suman=0;
    for k=1:n
        suman=suman+1/(n+k);
    end
    a(n)=suman;
end
```

h) $a_n = \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}}$

i) $\sqrt{6 + \sqrt{6 + \sqrt{6 + \dots}}}$

Recordar: $\begin{cases} a_1 = \sqrt{6}, \\ a_n = \sqrt{6 + a_{n-1}} \end{cases}$

j) $2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{\dots}}}$

Calculo del ej.1i)

```
a(1)=sqrt(6)
for n=2:50
    a(n)=sqrt(6+a(n-1));
end
```

- En el **1f)** no hace falta calcular el límite, pero en todos los demás sí.
- Escribe y calcula a mano los 5 primeros términos del **1f), 1g), 1i), 1j)**

2.- Series de términos positivos: Vamos a representar S_n

```
clear all % Ejercicio 2a)
for n=1:1000 % En series de térm. posit. es difícil saber en qué termino parar, pon el 1000
    sn=0;
    for k=1:n
        sn=sn+1/k^2; % *****
    end
    s(n)=sn;
end
plot(s, '*')
serie='pi^2/6'; % aquí ponemos el valor de la serie (que habremos calculado antes)
hold on
ezplot(serie, [0,1000]) % para representar  $S_n$  frente al valor de la serie
```

En el caso de la serie armónica $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ representa la serie frente a $\ln(x)$, ya que diverge, y de paso ves que $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln(n) + \gamma + \epsilon_n$

Ejercicio 2: Representa las siguientes series:

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(4 \cdot n - 1)}{2^n}$ d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4 \cdot n^2 + 8 \cdot n + 3}$ e) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{\sqrt{n^2 + n}}$

3.- Series alternadas: En las series alternadas podemos aproximar $S \approx S_n$ con un error $< |a_{n+1}|$. Entonces, dado un error_{admitido} haré: $\text{error} < |a_{n+1}| < \text{error}_{\text{admitido}}$ para hallar n y así obtener S_n

Ejercicio 3: Hallar el valor de las siguientes series con un error máximo admitido de 0'001.

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$ b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^{n+1}}{3^n}$

Soluciones exactas: a) $\frac{\pi^2}{12}$.

Cálculo del ejercicio 3a)

```
>> clear all, syms n
>> erroradmitido=0.001; % dato *****
>> solve(1/(n+1)^2-erroradmitido,n) % resolver  $|a_{n+1}| = \text{error}_{\text{admitido}}$  *****
    % ans =    30.6228
>> nmin=31 % redondear al entero superior *****
>> serieaprox=0;
>> for n=1:nmin
    sn=0;
    for k=1:n
        sn=sn+(-1)^(k+1)/k^2; % *****
    end
    s(n)=sn;
end
>> plot(s, '*')
>> serieaprox=sym( s(nmin) );
>> hold on
>> ezplot(serieaprox, [0,nmin])
```